



A retenir :

Faits marquants

- Défanage peu complexe du fait d'une senescence accélérée.
- Des rendements corrects grâce à de bonnes richesses
- Un début de récolte dans le dur !

Préconisations

- Quelques rares variétés encore vertes (Euroviva, Brennus...), protéger du mildiou jusqu'au bout.
- Pour les stockages de longue durée assurer vous d'avoir une bonne cicatrisation (peau) avant d'arracher.
- Attention aux chocs lors des arrachages .

QUELLES SONT LES PREMIERES TENDANCES DES RENDEMENTS FECULES CETTE ANNEE

Pour la deuxième année consécutive, le climat a été favorable à la fécule, bien que la fin de campagne soit moins favorable que 2024. Le mois d'août a été particulièrement chaud et sec, engendrant des stress thermiques et hydriques sur des végétations en fin de cycle. Les végétations ont donc décliné de façon plus ou marquée en fonction des secteurs géographiques mais aussi d'autres paramètres intraparcellaires.

En effet depuis fin Juillet, les faibles pluviométries du mois d'août (cf carte ci-contre) ont impacté négativement les biomasses, comme l'illustre le tableau ci-dessous, désormais au 16 septembre seulement 5% des parcelles prélevées sont encore bien vertes.




TABLEAU EVOLUTION DES BIOMASSES

Feuillage	19-août	02-sept	16-sept
Vert à bien vert (>7)	57%	38%	5%

Notation du feuillage :



Au 16 septembre, plus que 5% des parcelles prélevées sont encore bien vertes

Notons, que le facteur variétal a joué son rôle comme l'illustre la photo ci-dessus, où la variété Rackam décroche fortement par rapport à LD17.



Photo : Prise de vue le 15/09, végétation ; LD17 à gauche- Rackam à Droite
Source Coopérative de Vecquemont

Au-delà de ces facteurs, les ravageurs ont pu également engendré la mort prématurée des feuillages, nous avons pu observer la présence d'acariens qui entraînent une senescence accélérée selon les variétés ; Saprodi est une des variétés sur lesquels le phénomène a pu être relevé. D'autres ravageurs comme les cicadelles sont observées mais nous ne connaissons pas à ce jour les dégâts liés à cet insecte.

Enfin, chaque parcelles en faiblesse (rotations intensives, tassements, problème sanitaires...) se voit plus sensible aux maladies de fin de cycle, comme l'aternariose ce qui se traduit par une senescence accélérée.

PREMIERES ESTIMATION DES RENDEMENTS

Le réseau de parcelles féculières suivi comme chaque année par l'UNPT- GIPT-coopérative de Vecquemont permet d'apprécier l'évolution de la productivité de la saison. Ce réseau remonte les données de près d'une centaine de parcelles, de quoi apporter une bonne représentativité du comportement moyen grâce aux résultats des prélèvements réguliers effectués de la mi-juillet à la mi-septembre.



Les premiers prélèvements annoncés une campagne optimiste mais le plateau a été rapidement atteint, suite aux conditions du mois d'août. Les écarts sont fortement prononcés (Rdt à 17 : 23T à 70Tha), mais la moyenne reste proche de la moyenne à 5 ans.

	Date	22-juil	05-août	19-août	02-sept	16-sept
2025	Rdt brut	25,1	31,5	34,3	37,6	39,0
	Richesse	18,3	19,5	22,0	22,3	21,8
	Rdt à 17%	26,7	35,5	41,3	45,6	46,9
	R17 Mini	6,1	13,5	17,7	21,3	23,4
	R17 Max	47,0	57,0	65,7	69,7	70,0
	Ecart type	8,0	8,8	9,0	9,5	9,4
2024	Rdt brut	21,0	28,3	33,7	39,1	43,3
	Richesse	16,2	19,2	21,1	21,6	21,5
	Rdt à 17%	20,2	31,2	39,9	46,8	51,8
Moyenne 5 ans	Rdt brut	17,6	23,4	29,7	34,3	37,4
	Richesse	16,8	18,7	19,7	20,2	20,2
	Rdt à 17%	17,6	25,3	33,4	39,4	43,0

Nous pouvons constater que à partir du mois d'août le grossissement a été limité, avec un gain de 3T sur 2 semaines. Les températures élevées ont cependant permis un gain plus significatif de la richesse sur les jours aoûtins.

Désormais les richesses évoluent peu car les végétations sont désormais sénescentes dans de nombreuses situations. L'un des points positifs, de cette sénescence prématurée, c'est le faible taux de rejumelage/repousses physiologiques.

QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE DANS LE CONTEXTE ACTUEL ?

LES ARRACHAGES SONT DIFFICILES ET NECESSITENT DE PRENDRE DES PRECAUTIONS

La structure est dure à pénétrer en l'absence d'humidité suffisante. Les passages pluvieux en cours et à suivre dans les jours à venir devraient améliorer un peu la situation sur ce point ...

Les arrachages sont complexes, avec des mottes de terres sur les chaînes d'arracheuse, le réglage est difficile à trouver d'autant que les richesses sont élevées. Il est préférable dans ce contexte de privilégier les parcelles où les peaux sont bien cicatrisées pour éviter les blessures, et limiter les chocs en étant attentifs aux hauteurs de chutes qui ne doivent pas excéder 25cm. Les socs de l'arracheuses doivent être de niveau et ne pas être dans le dur de façon à ne pas remonter trop de mottes de terre.

De même, il peut être opportun de réfléchir à votre planning d'arrachages en fonction de la durée de vos stockages, plus le stockage sera long plus la qualité des produits récoltés a son importance.

Attention, sur les parcelles présentant encore de la végétation, soyons rigoureux dans la gestion du mildiou jusqu'au bout, surtout en cas de pluies orageuses qui pourraient être profitables au mildiou du tubercule. Si nécessaire protéger avec des sporicides RANMAN TOP, LEIMAY, SHIRLAN ... En effet, il est impératif d'éviter le stockage de tubercules pourris, qui dégradent la qualité en conservation.



PRECAUTIONS LORS DE LA MISE EN SILO

B. Poutrain (Directeur coopérative de Vecquemont)

La constitution du silo doit respecter des règles pour optimiser d'une part la conservation et d'autre part la sécurité de tous les acteurs, à commencer par les agriculteurs lors de la récolte. Les silos sont à placer dans une zone non dangereuse (pas de lignes électriques, de virages, de talus...) sur une remorque de large pour faciliter la ventilation, le bâchage et la reprise. L'emplacement doit être à plat.

- ✓ *L'extrémité du silo doit être accessible par la grue et le déterreur. L'ensemble doit disposer d'un espace d'au moins 20 mètres devant le silo.*
- ✓ *Les silos sont disposés le long de voies parallèles sécurisées, ou de chemins d'exploitation d'au moins 4 mètres de large entretenus, propres et en bon état. Les camions doivent y accéder par tous les temps.*
- ✓ *Vous devez maintenir un espace de 3 à 4 mètres entre la bande de chargement et le silo.*

Le bâchage est obligatoire dès lors que des pluies sont annoncées. Concernant les réceptions à l'usine, les agriculteurs peuvent assister aux réceptions. Les contrôleurs UNPT sont joignables de 5h à 20h du lundi au vendredi et de 5h à 13h le samedi. Tél 06 51 39 89 03.

Le travail effectif des contrôleurs consiste à assister aux opérations de réceptions et vérifier en permanence leur conformité. Ils vérifient également qu'il n'y a pas d'erreur de fonctionnement des outils de réception et veillent à la bonne cohérence des documents informatiques produits par les féculiers

DEMARRAGE D'USINE

Premiers constats : Concernant les livraisons de la coopérative, elles ont débuté ce lundi 15 septembre avec 112 camions livrés. Pour cette première semaine, voici quelques données.

Une tare terre moyenne 9,2 %, bien que de grosse tares à plus de 40% de terre sont constatées, du fait de la présence de mottes lors des chantiers de récoltes.

Globalement, nous avons 60% des camions livrés à moins de 5% de terre et 13% à plus de 15% de tare terre , la tare cailloux étant autour de 1,8%.

La densité est déjà bonne avec 21,2%

